

Hiekka ja sitä karkeammat maalajit ovat hyvin vet-
tä läpäiseviä ja sateet painuvat pian maan sisään,
pohjavedeksi, ja kasvien ulottumattomiin. Rintees-
sä istujalla jää takamus kuivaksi.

Tämä paikka on n. 100 m mpy eli kuuluu Ancyclus-vai-
heessa, 7000-5800 eKr, syntyneisiin rantoihin. Ran-
tahiekassa kasvavat kuivat kasvit, kuten kanerva,
sianpuolukka ja jäkälät. Jo Ancyclus-aikana tässä
kasvoi mäntyjä ja koivuja. Jonkinmoiset maayhteydet
itään olivat syntyneet, ja lämmintä ja kuivaa vaa-
tivia kasveja siirtyi harjujen asukkaiksi.

Kangasvuokko oli aikoinaan tällaisten rinteiden ta-
vallinen kasvi, samoin violettikukkainen kylmän-
kukka. Hiljattain on kangasvuokon todettu kasvavan
n. kilometriä pohjoisempana, Hevonojanmäen etelä-
rinteellä. Kylmänkukalla on yksi kasvupaikka Helve-
tinvuorella, hieman yli 2 km:n päässä pohjoiseen.
Aikoinaan näitä kasveja vietiin puutarhoihin koris-
tekasveiksi ja toreille myyntiin. Esiintymät vähe-
nivät. Kangasvuokko rauhoitettiin myynniltä 1926
ja kylmänkukka 1952.

Nyky aika uhkaa molempia kasveja myös kahdella muul-
la tavalla: soranotto kohdistuu harjuihin ja kas-
vualusta häviää. Metsänhoidolla voidaan tuottaa näi-
den kasvien kannalta liian tiheitä metsiä ja esiin-
tymät häviävät sen vuoksi.

Kylmänkukka on etelä-Hämeen maakuntakukka.

Kun lähdet eteenpäin, voit va-
lita joko 3- tai 4-rastin kaut-
ta kulkevan polun. Jos haluat
kierrellä kivikauden maisemas-
sa, mene rinnettä alas alemmal-
le tielle, joka kulkee aivan ala-
osassa. 4-rastin polku jatkaa
rinteessä, rasti on polulta hie-
man oikealla, näköalapaikalla.
(Jos haluat molemmille rasteille,
kierrä Someronlampien eteläpuo-
ta ja hirvipolkuja rinnettä suo-
raan ylös)

